

## КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към Reg. №	20010016
Разрешение №	9401 20. 04. 2010
Одобрение № .....	

### 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

NIZORAL 2% Shampoo  
НИЗОРАЛ 2% Шампоан

### 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

В един грам се съдържа 20 mg кетоконазол.

### 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Шампоан за локална употреба в областта на окосмената част на главата и кожата.

### 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

#### 4.1. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение и профилактика на инфекции, причинени от дрождите от вида *Malassezia* (преди наречен *Pityrosporum*) като pityriasis versicolor (локализиран), себореен дерматит и pityriasis capitis (пърхут).

#### 4.2. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Поразените участъци на кожата или косата се измиват с НИЗОРАЛ 2% Шампоан, който трябва да бъде оставен да действа на кожата/косата 3 до 5 минути преди изплакване.

##### *Лечение:*

Разноцветен лишай /pityriasis versicolor/: веднъж дневно в продължение на пет дена.

Себореен дерматит / seborrhoeic dermatitis/ и пърхут /pityriasis capitis/: два пъти седмично в продължение на 2 до 4 седмици.

##### *Профилактика:*

Разноцветен лишай: веднъж дневно в продължение на 3 дни по време на един курс на лечение преди лятото.

Себореен дерматит и пърхут: веднъж седмично или на две седмици.

#### 4.3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Извънена свръхчувствителност към кетоконазол или някоя от останалите съставки на шампоана. NIZORAL Шампоан 2% е противопоказан при лица с известна свръхчувствителност към някоя от съставките му.

## NIZORAL 2% Shampoo – Кратка характеристика на продукта

### 4.4. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

При пациенти, които са били продължително време на лечение с локални кортикоステроиди се препоръчва спиране на стероидната терапия постепенно за период от 2 до 3 седмици докато трае употребата на НИЗОРАЛ 2% Шампоан с цел да се избегне възможнота от rebound effect.

Увеличаването на косопада често е свързано със себорейния дерматит и пърхута и рядко може да бъде свързан с употребата на НИЗОРАЛ 2% Шампоан.

Да се избягва попадането му в очите. Ако това се случи, очите трябва да се измият с вода.

### 4.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не са известни.

### 4.6. БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Няма достатъчно и добре контролирани проучвания при бременни или кърмещи жени. Не се откриват плазмени концентрации на кетоконазол след локално приложение на NIZORAL Шампоан 2% на скалпа при лица, които не са бременни. Плазмени нива на NIZORAL Шампоан 2% се откриват след локално приложение върху цялото тяло.

Не са известни рискове, свързани с употребата на НИЗОРАЛ 2% Шампоан, по време бременност или при кърмене.

### 4.7. ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не са известни тъй като кетоконазол не прониква през кожата. Не е приложимо.

### 4.8. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както и при други шампоани, е възможна локална појава на парещо усещане, сърбеж, контактен дерматит (в резултат на дразнене или алергия) върху участъците на нанасяне. Редки съобщенията за омазняване и изсушаване на косата по време на периода, в който се употребява НИЗОРАЛ 2% Шампоан.

В редки случаи, главно при пациенти с химически увредена или побеляваща коса, се наблюдава обезцветяване на косъма, свързано с употребата на НИЗОРАЛ 2% Шампоан.

Допълнителни нежелани лекарствени реакции от НИЗОРАЛ 2% Шампоан, които са съобщавани в постмаркетингови доклади, са включени в Таблица 1. Тяхната честота е определена на базата на честотата на спонтанно съобщаване, съгласно следното степенуване:

Много чести  $\geq 1/10$

Чести  $\geq 1/100$  до  $< 1/10$

Нечести  $\geq 1/1\,000$  до  $< 1/100$

Редки  $\geq 1/10\,000$  до  $< 1/1\,000$

Много редки  $< 1/10\,000$ , включително изолирани съобщения

**Табл.1. Нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при постмаркетингов опит с НИЗОРАЛ 2% Шампоан, класифицирани по честота, определена според честотата на спонтанно съобщаване**

## NIZORAL 2% Shampoo – Кратка характеристика на продукта

### Нарушения на имунната система

Много редки свръхчувствителност

### Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много редки алопеция (вж. точа 4.4 съгласно Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба), обрив, уртикария, раздразнение на кожата, изсушаване на кожата

### Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много редки реакция на мястото на приложение

#### 4.8.1. Данни от клиничните изпитвания

Безопасността на NIZORAL Шампоан 2% е оценявана при 2890 лица в 22 клинични изпитвания, където NIZORAL Шампоан 2% е прилаган локално върху скалпа и/или кожата.

Не се съобщават нежелани лекарствени реакции (НЛР) при  $\geq 1\%$  от лицата, третирани с NIZORAL Шампоан 2%.

Нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани при  $<1\%$  от лицата, третирани с NIZORAL Шампоан 2% в клинични условия, са изброени в Таблица 1.

Таблица 1. Нежелани лекарствени реакции, съобщени при $<1\%$ от 2890 лица, третирани с NIZORAL Шампоан 2% в 22 клинични изпитвания	
<b>Системо-органска класификация</b>	
Предпочитан термин	
<b>Нарушения на очите</b>	
Очно дразнене	
Засилено съзлоотделяне	
<b>Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение</b>	
Еритема на мястото на приложение	
Дразнене на мястото на приложение	
Свръхчувствителност на мястото на приложение	
Сърбеж на мястото на приложение	
Пустули на мястото на приложение	
Реакция на мястото на приложение	
<b>Инфекции и инфестации</b>	
Фоликулит	
<b>Нарушения на нервната система</b>	
Дисгеузия	
<b>Нарушения на кожата и подкожната тъкан</b>	
Акне	
Алопеция	
Контактен дерматит	
Сухота на кожата	
Аномалии на структурата на косъма	
Обрив	
Чувство за парене на кожата	
Нарушения на кожата	
Ексфолиация на кожата	

#### 4.8.2. Постмаркетингов опит

## NIZORAL 2% Shampoo – Кратка характеристика на продукта

Нежеланите лекарствени реакции, които за пръв път са открити по време на постмаркетинговия опит с NIZORAL Шампоан 2%, са включени в Таблица 2 и 3. Във всяка таблица честотата е дадена според следното правило:

Много чести	$\geq 1/10$
Чести	$\geq 1/100$ и $< 1/10$
Нечести	$\geq 1/1,000$ и $< 1/100$
Редки	$\geq 1/10,000$ и $< 1/1,000$
Много редки	$< 1/10,000$ , включително отделни съобщения

В Таблица 2, НЛР са представени по честота въз основа на честотата на спонтанните съобщения. В Таблица 3, НЛР са представени по честота въз основа на честотата по време на клиничните изпитвания или епидемиологичните проучвания, когато е известна.

[**Забележка към регуляторните органи:** Отделните събития, изброени във всяка от следните две таблици, са еднакви. Разликата между двете таблици е в източника на информация, използван при оценка на честотата на всяко събитие, която е честотата на спонтанните съобщения в Таблица 2 и точната честота по време на клиничните изпитвания в Таблица 3. При оформяне на местната информация въз основа на CCDS ще се избере само едната от двете таблици за включване в раздела „Постмаркетингови данни“ в зависимост от местните регуляторни изисквания/указания.]

**Таблица 2. Нежелани лекарствени реакции, установени по време на постмаркетинговия опит с NIZORAL Шампоан 2%, според честотата, изчислена от спонтанните съобщения**

**Нарушения на кожата и подкожната тъкан**  
Много редки      Уртикария, промяна на цвета на косата

**Таблица 3. Нежелани лекарствени реакции, установени по време на постмаркетинговия опит с NIZORAL шампоан 2%, според честотата, изчислена по време на клиничните изпитвания или епидемиологичните проучвания**

**Нарушения на кожата и подкожната тъкан**  
Не е известна      Уртикария, промяна на цвета на косата

## 4.9. ПРЕДОЗИРАНЕ

Не може да се очаква, тъй като НИЗОРАЛ 2% Шампоан е предизначен само за външна употреба. При случайно поглъщане трябва да бъдат предприети само поддържащи и симптоматични мерки. С цел избягване на аспирация, не трябва да се прави стомашна промивка или да се предизвиква повръщане.

## 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

### 5.1. ФАРМАКОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА

## NIZORAL 2% Shampoo – Кратка характеристика на продукта

Кетоконазол е синтетично имидазол-диоксоланово производно с мощно антимикотично действие срещу дерматофити, като *Trichophyton* spp., *Epidermophyton* spp., *Microsporum* spp., и дрожди като *Candida* spp. и *Malassezia* spp. (*Pityrosporum* spp.). НИЗОРАЛ 2% Шампоан бързо облекчава лъшненето и сърбежа, които обикновено съпровождат себорейния дерматит, пърхута и обикновения лишай.

### 5.2. ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ СВОЙСТВА

Не е установена плазмена концентрация на кетоконазол след локално приложение на НИЗОРАЛ 2% Шампоан по скалпа. Плазмени нива на НИЗОРАЛ 2% Шампоан са установени, след локална употреба върху цялото тяло.

### 5.3. ПРЕДКЛИНИЧНИ ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не е показан особен риск при хора според наличните предклинични данни, базирани на конвенционални проучвания, които включват остра орална и дермална токсичност, първично очно дразнене и токсичност за кожата при повторно приложение.

Проучвания за остра орална токсичност с единична доза с шампоан при гризачи, показват граница на безопасност приблизително от 83 до 125 пъти (базирана на mg/kg), сравнено с единократно приложение на клинична доза 2% шампоан. Проучвания за остро дермално и очно дразнене при зайци, с лекарствена форма на кетоконазол шампоан, показват минимално дразнене с добро обратно развитие. В проучвания за хронична (6-месечна) дермална токсичност при зайци, с доза до 50 mg/kg дневно, резултатите показват, че лекарствената форма шампоан не води до дермални или системни токсични реакции и няма потенциал за повишаване на чувствителността.

## 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

### 6.1. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

НИЗОРАЛ 2% Шампоан:

Натриев лаурилсулфат  
Динатриев монолаурил сулфосукцинат  
Диетаноламид от кокосова мастна киселина  
Хидролизиран с лаурдимониум животински колаген  
Макрогол 120 метилглюкозен диолеат  
Парфюм  
Имидурея  
Хлороводородна киселина  
Натриев хидроксид  
Натриев еритрозин  
Натриев хлорид  
Пречистена вода

### 6.2. НЕСЪВМЕСТИМОСТИ

Не са известни.

### 6.3. СРОК НА ГОДНОСТ

3 години

## NIZORAL 2% Shampoo – Кратка характеристика на продукта

### **6.4. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява при температура между 15 и 25°C.

### **6.5. ДАННИ ЗА ОПАКОВКАТА**

60 ml бели бутилки от полиетилен с висока плътност с полипропиленови капачки.

### **6.6. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

Измийте инфектирани участъци на кожата с НИЗОРАЛ 2% Шампоан и не ги изплаквайте в продължение на 3 до 5 минути, за да може препаратът да проникне добре. Шампоанът трябва да покрие и самата кожа, а не само космите.

За едно измиване е достатъчно съдържанието на една шепа от шампоана.

## **7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Johnson & Johnson D.O.O.  
Šmartinska cesta 53  
1000 Ljubljana  
Slovenia

## **8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

20010016

## **9. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА**

07/2009