

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към Reg. № 20011053	
Разрешение № 9652 / 20.05.2010	Одобрение № 9972 /

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

TANAKAN 40 mg film-coated tablets

ТАНАКАН 40 mg филмирани таблетки

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Ginkgo bilobae folium extractum siccum containing 24% flavones glycoside and 6% of ginkgolides-bilobalide (EGb 761) 40 mg

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирани таблетки

4. КЛИНИЧНИ СВОЙСТВА

4.1 Терапевтични показания

- Симптоматично лечение на патологичен когнитивен и хроничен невросензорен дефицит при пациенти в напреднала възраст (с изключение на болестта на Алцхаймер или други деменции).
- Симптоматично лечение на итермитиращо накуцване при хронични облитериращи артериопатии на долните крайници (стадий 2).
- При симптоми свързани с нарушения на остротата на зрението и зрителното поле с предполагаем исхемичен произход.
- При лечение на слухово-вестибуларни смущения (тинитус, вертиго, хипоакузия с предполагаем исхемичен произход).
- При синдрома на Рейно.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение.

3 таблетки дневно, разпределени през деня.

Таблетките трябва да се приемат с половин чаша вода, по време на хранене.

4.3 Противопоказания

Този лекарствен продукт е противопоказан при свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества.

4.4 Специални предупреждения и специални мерки при употреба

Предупреждения:

Тъй като лекарствения продукт съдържа лактоза, той е противопоказан при пациенти с вродена галактоземия, глюкозен или галактозен синдром на малабсорбция или лактазен дефицит.

4.5 Взаимодействия с други лекарствени средства и други форми на взаимодействие

Няма проучвания за взаимодействията.

4.6 Бременност и кърмене

Този лекарствен продукт се използва главно при възрастни, където не съществува риск от бременност.

Поради липсата на съответни клинични данни, употребата на този продукт по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

4.7 Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не е приложимо.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Рядко храносмилателни смущения, прояви на свръхчувствителност, главоболие.

4.9 Предозиране

Няма съобщения за случаи на предозиране.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

ATC: N06DX 2

Периферен вазодилататор

(С: сърдечно-съдова система)

Многобройните механизми, обуславящи терапевтичните действия на Танакан досега не са изучени при хора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Симптоматичното лечение на интермитиращо накуцване при хронични облитериращи артериопатии на долните крайници (стадий 2) се основава на клинични